

शेंदरी बॉडअळी नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजना

<p><u>२ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०१८</u></p> <p>पीक वाढीच्या अवस्था: पेरणीनंतर ७५-१०५ दिवसांपर्यंत (फुले, पाते, बोंडे तयार होण्याची अवस्था)</p>	<ul style="list-style-type: none">● पिक फुलोरा अवस्थेत असल्यापासून प्रती एकरा २ कामगंध सापळे बसवून सतत निरीक्षणे करावीत.● कामगंध सापळ्यातील वडी (ल्यूर) त्याच्या वैधता तारखेप्रमाणे बदलावी.● कामगंध सापळ्यात अडकलेले पतंग प्रत्येक आठवडयाला बाहेर काढून नष्ट करावेत.● जर किडीने आर्थिक नुकसान पातळी ओलांडली असेल (म्हणजेच सर्वसाधारण नर पतंग ८ प्रती सापळा सलग ३ दिवस सापडल्यास) मास ट्रॅपिंगसाठी जास्तीचे ६ कामगंध सापळे प्रती एकरा लावावेत.● प्रती एकर (रॅन्डमली) २० हिरवी बोंडे घेवून (एक बोंड प्रती झाड) त्याचा काप घेवून पहाणी करावी. १० % प्रादुर्भावग्रस्त फुले किंवा बोंडात जिवंत अळ्या आढळल्यास क्विनॉलफॉस २५% एएफ २० मिली किंवा थायोडीकार्ब ७५% डब्ल्यूपी २० ग्रॅम/प्रती १० लिटर पाणी घेवून फवारणी करावी.● १० ते १५ दिवसाच्या अंतराने क्लोरोपायरीफॉस २० % ईसी २५ मिली किंवा थायोडीकार्ब ७५ डब्ल्यूपी २० ग्रॅम प्रती १० लिटर पाणी घेवून फवारणी करावी.● उपलब्धता असल्यास सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयात किंवा ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात परजीवी ट्रायकोग्रामा बॅक्टेरी ६०००० अंडी प्रती एकर प्रमाणे वापर करावा.● साधारणपणे एका ट्रायकोकार्डवर ५००० - १८००० ट्रायकोग्रामा बॅक्टेरी अंडी असतात.● ट्रायकोकार्ड लावल्यानंतर साधारणपणे १० दिवस किटकनाशकांची फवारणी टाळावी.
<p><u>१ ऑक्टोबर ते ३० ऑक्टोबर २०१८</u></p> <p>पीक वाढीच्या अवस्था: १०५-१३५ बोंडे भरणे, बोंडे फुटणे</p>	<ul style="list-style-type: none">● सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवडयात ट्रायकोकार्ड लावलेले नसतील तर चार ट्रायकोकार्ड प्रती एकरा लावावेत.● प्रती एकरातील रॅन्डमली २० हिरवी बोंडे घेवून शेंदरी बॉडअळीची निरीक्षणे घ्यावीत.● किड आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर (कामगंध सापळे किंवा हिरवी बोंडे पाहिल्यानंतर) गेलेली असेल तर लगेच फेन्व्लरेट २० % ईसी १० मिली किंवा सायपरमेथ्रिन १०% ईसी १० मिली प्रती १० लिटर पाणी घेवून फवारणी करावी.

१ नोव्हेंबर २०१८ ते १५

जानेवारी २०१९

पीक वाढीच्या अवस्था:

१८०-२१० बॉड फुटणे, वेचणी

- शेवटची वेचणी करुन वेचणी झालेल्या शेतात चरण्यासाठी मोकळी जनावरे सोडावीत.
- पाण्याची उपलब्धता असेल तर उन्हाळी पिकाची फेरपालट करावी.